LE PRINCIPALI VARIETÀ' DI OLIVO COLTIVATE IN UMBRIA

varietà	produttività	contenuto in olio	qualità dell'olio	ambito di interesse
Dolce Agogia	elevata	medio-alto	buona	Lago Trasimeno
S. Felice	media-elevata	medio-alto	buona	Gualdo Cattaneo Montefalco
Frantoio	elevata	medio-alto	elevata	Regionale
Leccino	media-elevata	medio	buona	Regionale
Maurino	media-elevata	medio	buona	Regionale
Moraiolo	media-elevata	medio-alto	elevata	Regionale
Nostrale di Rigali	media	alto	media	Gualdo Tadino
Pendolino	media-elevata	medio	buona	Regionale

POTATURA

TAGLI

INCLINAZIONI

PIEGATURE

DECORTICAZIONI

CIMATURE

GESTIONE DEL SUOLO

ogni scelta deve basarsi sulla natura, struttura e giacitura del suolo agrario;

la gestione del suolo ha diretto effetto sulla stabilità e sulla capacità di immagazzinamento di risorse idriche e nutritive.

TIPI DI GESTIONE DEL SUOLO

- ✓ **lavorazione profonda (> 15 cm**): sempre sconsigliabile
- ✓ **lavorazione superficiale (< 15 cm**): ha effetti positivi (ad es. eliminazione della flora infestante, limitando la competizione idrica) ed effetti negativi (ad es. rischi di ruscellamento, danni alla struttura del terreno);
- ✓ **inerbimento:** ha effetti positivi (limitazione di erosione e smottamenti, minor costipamento terreno e miglior struttura, bassi costi poiché solo intervento di trinciatura) e negativi (riduzione risorse idriche disponibili);
- ✓ **diserbo:** ha effetti positivi (diminuzione competizione idrica) e negativi (tossicità, accumuli, richio erosione)

FERTILIZZAZIONE

obiettivo è il **reintegro dei nutrienti asportati** dalle piante di ulivo e della eventuale vegetazione erbacea presente.

- **Priorità:** reintegrare la sostanza organica (effetti nutrizionali, strutturali e su capacità idrica)

MODALITA'

- ✓ **in terreni lavorati**, al momento della lavorazione autunnale;
- ✓ **in terreni inerbiti**, in copertura in autunno, al fine di facilitare la penetrazione con le piogge;
- ✓ **in terreni sciolti**, meglio frazionare in 2 o 3 dosi;
- ✓ **negli oliveti radi**, solo sottochioma;
- ✓ **Dosi massime**: N 120 kg/Ha; Anidride Fosforica 25 kg/Ha; Ossido di Potassio 100 kg/Ha